



Какие обследования необходимо пройти для безопасного проведения операции?

- RW (сифилис), HBsAg (гепатит В), anti-HCV (гепатит С), ВИЧ – действительно 3 месяца
- Общий анализ крови развернутый – действительно 14 дней
- Коагулограмма (АЧТВ, протромбин, МНО, протромбиновое время) – действительно 14 дней
- Анализ на аллергию к лидокаину – действительно 6 месяцев
- ЭКГ (с расшифровкой) – действительно 14 дней
- Биохимический анализ крови: общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевины – действительно 14 дней
- Консультация терапевта – действительно 14 дней
- УЗИ молочных желез (**маммопластика**) – действительно 3 месяца
- Группа крови и резус фактор – действительно бессрочно (можно сделать копию, если указано в паспорте)
- При наличии заболеваний – консультация профильного специалиста (заключение должно содержать диагноз и код по МКБ-10, а также заключение «Оперативное лечение не противопоказано»)
- УЗИ передней брюшной стенки (**абдоминопластика, липосакция живота**) – действительно 3 месяца
- Дуплекс вен нижних конечностей с последующей консультацией сосудистого хирурга (оценка группы риска ТЭО, допуск к оперативному лечению, рекомендации по применению периперационной антикоагулянтной терапии) – (**для операций длительностью более 40 минут, абдоминопластика, липосакция, липоскульптура/липофилинг, возраст старше 35 лет**) – действительно 1 месяц

Сдавать анализы и проходить консультации можно в любой удобной лаборатории или другом медицинском учреждении при соблюдении объема консультирования. Перечень специалистов и лабораторий, которые имеют высокую надежность будут указаны на отдельном листе. Пациента допускают на операцию только при наличии всех анализов, необходимых для конкретной операции.

По готовности всех анализов – прислать фото результатов ассистентке Олеся по **WhatsApp** или **Telegram**: +7 (906) 479-20-05



Когда не стоит выполнять операцию?

- При ОРВИ и других простудных заболеваниях
- При обострении хронических заболеваний
- В состоянии депрессии и эмоциональной лабильности
- Во время беременности и лактации

Что рекомендовано сделать перед операцией?

- За 3 дня до операции начать прием **«Транексам»** по 500 мг 3 раза в день в течение 3 дней
- 2 недели до операции и 2 недели после отказаться от курения любых видов никотина (или максимально сократить потребление)
- Компрессионные чулки (**II класс** компрессии)
- Антибиотик **«Амоксиклав»** (875±125) за 1 день до операции по 1 таблетке 2 раза в день (утро/вечер) и продолжать прием в течение 1 недели после операции
- **«Линекс Форте»** – 1 капсула 1 раз в день – начать прием вместе с антибиотиком и принимать еще 1 неделю после отмены антибиотика для профилактики дисбактериоза
- Хороший поливитаминный комплекс – пропить за 1-2 недели до операции
- Хорошо и правильно питаться, пить побольше жидкости, избегать стрессовых ситуаций, добавить активные прогулки на свежем воздухе за 1-2 недели до операции

Где узнать более подробную информацию или посмотреть результаты работ?

В нашем телеграмм-канале **@BUTKOPLASTIC** вы найдете:

- Результаты работ «до и после»
- Статьи, заметки и наблюдения по разным видам операций
- Видео и фото без цензуры
- Интраоперационные видео
- Более детальную визуализацию швов и нюансы операций
- Анонсы и объявления
- Контент, который нельзя публиковать в других социальных сетях

